核判	主任	副主任				
區分		v				

編號:115076-1
日期:115 年 10 月 7 日

雙週藥訊

「流感疫苗有把關 接種預防好安全」

➢ **流感疫苗是什麼？**

流感疫苗能減少感染流感的機率，降低流感重症、併發症與住院風險，是保護自己與家人健康的最佳方式。

➢ **為什麼需每年接種？**

流感病毒株容易變異，且保護力會隨時間下降，一年一次接種預防好安心！

➢ **食藥署如何確保疫苗的安全有效？**

1、核發許可證（上市前審查）：疫苗在臺灣使用，須先通過審查並取得藥品許可證，且每年病毒株變更仍須通過審查與核准。

2、逐批檢驗：每批疫苗都會進行文件審查與國家實驗室檢驗，全部合格才能放行。

3、核發封緘證明及藥物檢查證 ：逐批檢驗合格後核發封緘證明書，並於產品外盒加貼藥物檢查證，代表該批疫苗安全、品質合格。



來源：衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判區分	主任	副主任				
		v				

雙週藥訊

編號: 115076-2
日期:115 年 10 月 20 日

「一噁心就吃止吐藥？」

止吐藥之使用時機與就醫重點判斷

噁心與嘔吐是常見的不適症狀，許多人一感到反胃、想吐，就會立刻服用止吐藥，希望盡快緩解症狀。然而，造成噁心、嘔吐的原因相當多元，若未先釐清原因便自行使用藥品，可能掩蓋病情警訊，延誤治療時機。

➢常見止吐藥大致可分為三類

第一類、多用於腸胃炎、消化不良或胃排空功能較差所引起的噁心與嘔吐。

第二類、預防及緩解動暈症引起的噁心、嘔吐、頭暈等不適。

第三類、預防及治療癌症化學治療或放射治療引起的噁心、嘔吐。

➢出現警訊症狀 應儘快就醫評估

觀察症狀變化也是判斷是否需要就醫的重要依據。警訊症狀如下：

- 出現嘔吐症狀時，可先回想近日是否曾食用不潔食物，並留意是否伴隨腹瀉、腹痛、發燒等症狀。
- 腸胃不適時，可能是因為過於油膩或過甜的飲食影響胃排空引起。若屬輕微，可先補充水分與電解質，待症狀稍緩後，再少量攝取清淡食物，多數情況可逐漸改善。
- 出現口乾舌燥、心跳加快等脫水徵兆，或伴隨持續劇烈嘔吐、明顯腹脹、吐血、嘔吐物帶有膽汁等警訊症狀，則應盡快就醫。
- 部分嚴重疾病初期也可能以噁心、嘔吐表現，若僅依賴止吐藥壓制症狀，反而可能延誤診斷與治療。

來源：衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw

中彰榮家主任暨全體員工關心您