

國內出現今年首例日本腦炎病例，請民眾加強防蚊並按時攜幼兒接種疫苗(2019-05-17)

疾病管制署公布國內今(2019)年首例日本腦炎確定病例，為高雄市60多歲男性，5月1日開始出現發燒、頭痛、抽搐及意識不清等症狀就醫並收治住院，其後個案因症狀持續且意識改變，5月4日由院方通報後轉院治療，並於5月17日檢驗確診，目前個案仍意識昏迷在加護病房治療中，同住家人1人日前有疑似症狀，現已康復，尚待檢驗中。

疾管署表示，衛生單位調查，該個案近期無國外旅遊史，相關疫苗接種史不詳，平日主要活動地點為住家附近，惟潛伏期間曾至大寮區友人家和鳳山區自然遊憩場所，且該些場所2至3公里內分別有豬舍、肉品市場及多處水稻田，衛生單位已前往個案住家、活動地周邊進行環境調查及懸掛誘蚊燈等防治措施，同時加強對附近民眾之衛教宣導。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2015至2018年全國同期確定病例數分別為0、1、1及2例；近年各縣市多曾出現散發病例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有

感染風險，民眾不能掉以輕心。

日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿 15 個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地等處附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。相關資訊可至疾管署全球資訊網

（<https://www.cdc.gov.tw>）或撥打免付費防疫專線 1922（或



衛生福利部疾病管制署
Taiwan Centers for Disease Control

0800-001922) 洽詢。