

# 衛教園地—認識隱翅蟲衛教介紹

## ● 何謂隱翅蟲？

隱翅蟲(Rove beetle)為一種小型昆蟲，台灣地區最常見的是褐毒隱翅蟲，身體為橘黃色，頭、胸及尾部為鐵青色，腹部是黑黃色相間環紋，故俗稱「青螞蟻」。

## ● 隱翅蟲棲息地：

喜好棲息在稻田、公園、草叢或樹林中，能飛又能爬，在夏季出沒，棲息處受到騷擾(如天氣濕熱、雷雨過後、除草、整地、砍樹、收割稻子等)，就會傾巢而出。隱翅蟲有趨光習性，常在晚上飛入有燈火的地方，夏天在公園散步或野外活動者都是高危險群。由於體型小，常潛入住家中，危害人體。故隱翅蟲常被暱稱為「夏夜裡的毀容怪客」！

## ● 隱翅蟲皮膚炎(Paederus dermatitis)

隱翅蟲並不會螫人，隱翅蟲皮膚炎(Paederus dermatitis)乃因接觸到它含有刺激性物質『隱翅蟲素(Pederin)』的體液，蟲體在皮膚上爬行時，就會從關節腔中分泌出體液，而引起皮膚病變，造成典型的線狀病灶，只要接觸 10-15 秒就有反應，有劇烈灼熱刺痛。當蟲體被打死或捻碎時，體液大量濺出，24 小時內就會造成皮膚的起泡及潰爛。患者沾到刺激性體液之手指，若再去接觸其他區域皮膚，就會引起更廣泛的病灶。

## ● 預防隱翅蟲侵襲的措施如下：

1. 在野外或草地活動，應穿著長袖衣物或使用驅蟲液。
2. 隱翅蟲因有趨光性，就寢前先檢查床舖是否有隱翅蟲，就寢時關燈，並使用蚊帳。
3. 看到隱翅蟲時，千萬不可用手拍打，最好用扇子煽走或用嘴巴把它吹走。
4. 萬一接觸到蟲體體液，應迅速以肥皂及大量清水洗淨。

## ● 注意事項及治療：

隱翅蟲皮膚炎引起的皮膚發炎及潰爛，病灶可在 3-4 天乾燥，一周左右即可痊癒。若未適當處理，則可能引起細菌感染及全身過敏反應，甚至於留下不可逆性的色素沉澱疤痕！所以，一旦被隱翅蟲接觸，首要工作就是用清水溫和地沖洗病灶，並以乾淨紙巾或毛巾壓乾病灶，然後迅速就醫，臨床上可以酌情使用抗組織胺、抗生素或外用藥膏來緩解症狀。

