

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:111128-1

日期:111年9月7日

向跌倒說不！安全用藥是關鍵

可能造成跌倒副作用的藥物如下：

- 一、作用在中樞系統的藥物：包括抗精神病藥、抗憂鬱藥及鎮靜安眠藥等，會造成鎮靜及影響認知。
- 二、作用在心血管系統的藥物：可能造成電解質不平衡、心跳速率改變等，老年人對此類的藥品較敏感，更可能增加副作用的發生。
- 三、其他種類藥品：如緩瀉劑、治療感冒過敏使用的抗組織胺、降血糖藥及帕金森氏症治療藥品，這些藥物因本身的副作用，可能造成增加如廁頻率、嗜睡、注意力不集中、低血糖症狀、肌肉無力、頭暈等，而提高跌倒風險。

再次呼籲長輩需瞭解自身目前使用藥品的特性和副作用，遵照醫囑服藥，適時諮詢藥師及醫師、護理人員以減少跌倒的發生機率。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:111128-2
日期:111年9月21日

三大用藥守則 藥知道沒煩惱


三大用藥守則 藥知道沒煩惱

藥品分三級




處方藥

須由醫師診斷
需要醫師處方後使用



指示藥

不需醫師處方箋
但須醫師/藥師/藥劑生
指導使用




成藥

民眾可自行
購買使用

1 要詢問醫師/藥師



衛部(署)藥製第000000號



藥品資訊

成分：XXXXXXXXXX

用途：XXXXXXXXXX

用法用量：XXXXXXXXXX



2 要詳讀外盒/仿單/藥袋

3

藥物過敏

6大前兆

症狀

眼睛不適

紅

口腔潰瘍

破

眼睛、
嘴唇腫

腫

燒 發燒

痛 喉嚨痛

疹 水泡、
皮膚紅疹

