

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:111185-1

日期:111年12月7日

過敏服用抗組織胺「藥」注意

雖然抗組織胺對過敏反應有幫助，但有些人使用抗組織胺前，務必經過醫師或藥師的指示再使用，以免造成健康風險，例如：懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓，以及心、肝、腎功能不佳的人。

抗組織胺常見的副作用有嗜睡、注意力不集中等，因此不論是開車、騎車，或是操作精密儀器、大型機具時，皆不宜使用抗組織胺，以免發生危險。另外，抗組織胺也應避免與酒精、果汁、葡萄柚汁等一起食用，以免產生交互作用。

使用抗組織胺藥品需經專業醫療人員評估，醫師會視患者的需求提供建議，例如舊一代抗組織胺容易產生嗜睡副作用，醫師可能會用於輔助過敏患者達到助眠效果。尋求專業醫療人員協助時應告知身體狀況，以利醫師與藥師協助選擇合適藥品。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:111185-2

日期:111年12月21日

正確用藥，改善攝護腺肥大！

甲型交感神經抑制劑是改善攝護腺肥大最常見的藥品，能讓攝護腺平滑肌放鬆，使尿道空間不再受壓迫，進而改善排尿不順等症狀。

甲型交感神經抑制劑可分為三代：

第一代：doxazosin 等成分，同時有降血壓的效果，若沒有高血壓問題者，服用後可能有頭暈情況發生。

第二代：tamsulosin 等成分，由於作用機轉的專一性較高，較不會造成頭暈。

第三代：silodosin 等成分，其專一性更好，但可能有射精時沒有精液的副作用。

不同代的藥品各有優點，因此醫師會針對患者的身體狀況、生活型態等，選擇適合藥品，若有低血壓、姿勢性低血壓以及青光眼的患者，務必在就醫時告知，以利醫師診斷開藥。

攝護腺肥大的治療方式著重在改善症狀，肥大組織仍會存在，因此在用藥上如同慢性病藥品，須配合醫囑規律服用。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您