

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:112021-1

日期:112年2月9日

管制藥品層層把關，防濫用成癮

鎮靜劑、安眠藥及癌症常用的止痛藥，大多屬於「管制藥品」。管制藥品共分為4級，目前大多數的麻醉藥品，屬於第1級或第2級，而鎮靜劑或安眠藥，多屬第3級或第4級。

管制藥品雖具有醫療用途，但也可能因不當流用、濫用後而導致成癮，為了使管制藥品不致於淪為非法毒品，法令規定，醫師必須領有**管制藥品使用執照**，才能開立第1~3級管制藥品專用處方箋；而藥師也必須依「**管制藥品專用處方箋**」才可調劑此類藥品；此外，領藥時，必須出具**身分證明**，並在專用處方箋上簽名。藉由層層管制，確保民眾用藥安全。

患者應依據醫師開立的管制藥品處方箋，遵循醫囑正確服用。若管制藥品不是由醫師診斷、開立，甚至來路不明，切勿服用以免無法改善病情，還可能上癮或造成更嚴重的傷害。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:112021-2

日期:112年2月22日

藥品分三級，看清標示「藥」注意

藥品分3級 看清標示 「藥」注意



處方藥

須由醫師診斷、需要醫師處方後使用

使用需特別注意，必須經由醫師診斷及處方，由藥師調劑給藥。例如心臟病、高血壓、糖尿病與抗生素等用藥。



指示藥

不需要醫師處方箋，但須由醫師、藥師指導使用

使用安全性較處方藥高，不需要醫師處方，經由醫師或藥師用藥指導，可在藥局購買，例如胃腸用藥與綜合感冒藥等。



成藥

民眾可以自行購買使用

使用安全性較指示藥高，藥理作用緩和，不需要醫藥專業人員指示，但民眾使用前需閱讀藥品說明書與標示。



來源：衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw

中彰榮家主任暨全體員工關心您