

核判 區分	主任	副主任				
		√				





雙週藥訊


編號:112038-1

日期:112年3月8日

耐心塗油劑 告別灰指甲

- 

1 銼甲。清潔趾(指)甲後
最好用可拋棄式的指甲銼刀
將患部(指甲表面)盡可能銼平
- 

2 擦拭。
以酒精棉片進行擦拭
- 

3 塗抹。
再塗上抗甲癬油劑
使用次數為每週 1 至 2 次

目前市售的抗甲癬油劑，有效成分為 Amorolfine，使用時可能造成趾(指)甲周圍輕度、短暫灼熱感，要注意用於患部的指甲銼刀，不可以再用於健康的趾(指)甲。

Amorolfine 抗甲癬油劑應持續使用至趾(指)甲再生、患部痊癒為止。療程視感染程度、部位及趾(指)甲生長速度而定，通常手指甲需 6 個月，腳趾甲需 9 至 12 個月。如果連續使用 3 個月無效時，應停藥並請醫師診治。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:112038-2

日期:112年3月22日

銀杏葉別亂吃，注意藥品交互作用

銀杏葉和俗稱「白果」的銀杏果不同，銀杏果只是一般的食品，無治療疾病的效果；而銀杏葉的萃取物則屬於藥物，有改善末梢血液循環不良的功效。

口服銀杏葉藥品 3 要點：

- 1. 注意藥品交互作用：**銀杏葉藥品會抑制血液凝集，與抗凝血劑、抗血小板藥品和非類固醇抗發炎藥品併用，可能會出現交互作用。
- 2. 手術前七天應停止使用：**因該類藥品會抑制血液凝集，易增加手術期間的出血風險，如果近期必須進行手術（包含牙科手術），請務必告訴醫師正在服用該藥品，由醫師進行評估是否停藥；重大手術則務必於手術前 7 天停止使用。
- 3. 注意藥品不良反應：**該藥品可能會造成出血的不良反應，用藥期間如有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血（如黑便、血便、吐血）等症狀，應即刻停藥並及早就醫處置。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您