

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:113072-1

日期:113年9月11日

## 正確用藥避免燒燙傷口惡化

燒燙傷發生時，須以「沖、脫、泡、蓋、送」原則進行處理。無論傷口大小，應沖冷水15至30分鐘降溫，避免熱能繼續傳遞，若已起水泡切勿弄破，讓傷口自行癒合。

- (1) **燒燙傷專用藥膏**：含氧化鋅，具吸熱、抗過敏效果，並含抗生素與銀離子成分，可消炎、抑菌，避免感染，適合發生燒燙傷半小時內厚敷，可避免範圍擴大及惡化。
- (2) **外傷兼燙傷藥膏**：含抗生素，可預防燙傷引起的傷口感染。但若是質地透明且為油性的藥品，是以凡士林（石蠟）為基底，在燒燙傷急性期不能使用，因為凡士林蓋住傷口，難以降低傷口的熱度，恐使傷口惡化，可待傷後第二、三天再使用。

燙傷藥膏一天使用兩次，若傷口會滲出組織液，則可選擇具吸收傷口分泌物、維持傷口濕潤環境、防止感染等功能的傷口敷料，一天更換2-3次，直到痊癒為止。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:113072-2

日期:113年9月25日

## 攜帶自用管制藥品出入境注意事項

### 攜帶自用管制藥品出入境 你需要知道?

#### 入境 ✈️



★ 當地醫療院所的證明。



★ 攜帶量不超過該醫療證明的處方量。



★ 需隨身攜帶。  
★ 不可以郵寄或快遞等方式寄送。

#### 出境 ✈️

事先了解入境國相關規定



★ 原主治醫師所開立診斷證明書或處方箋影本。

管制藥品品項可至  
食藥署網站查詢!

