

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:113080-1

日期:113年10月9日

## 藥品百百種，怎麼保存最好？

- (1) **泡殼包裝**：藥品有個別防潮保護，每次服用時壓取所需藥量即可，不會使其他藥品受損，影響隔絕空氣的功能。
- (2) **藥罐容器**：每次使用後都應確實轉緊或蓋緊，藥罐若有放棉花或乾燥劑，開封後應即丟棄，避免後續接觸空氣、吸收濕氣，反而讓罐內變成潮濕環境。
- (3) **診所提供的藥包**：這是藥師依據處方箋完成的調劑，因此撕開藥包後就應該確實服用完畢，尚未需要服用的藥包應避免提前拆開，並用夾鏈袋將藥包做密封防潮。

一般藥品存放於室溫下即可，除非有特別標示或藥師提醒，才需存放於冰箱冷藏(2-8°C)，否則保存於冰箱反而容易使藥品受潮變質。勿置於陽光直接照射或濕熱環境中，例如：夏天車內高溫可能超過 50°C，不利於儲存藥品，很容易造成藥品變質，應多加留意。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

擬：陳閱後，按日期張貼各房公告並上傳  
本家官網衛教園地及官方 FB 供民眾點閱

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:113080-2  
日期:113年10月23日

## 三大用藥守則 藥知道沒煩惱


### 三大用藥守則 藥知道沒煩惱

#### 藥品分三級



##### 處方藥

須由醫師診斷  
需要醫師處方後使用



##### 指示藥

不需醫師處方箋  
但須醫師/藥師/藥劑生  
指導使用



##### 成藥

民眾可自行  
購買使用

#### 1 要詢問醫師/藥師



衛部(署)藥製第000000號



藥品資訊

成分：XXXXXXXXXX

用途：XXXXXXXXXX

用法用量：XXXXXXXXXX



#### 2 要詳讀外盒/仿單/藥袋

#### 3

#### 藥物過敏 6大前兆 症狀

眼睛不適

紅

口腔潰瘍

破

眼睛、  
嘴唇腫

腫

燒 發燒

痛 喉嚨痛

疹 水泡、  
皮膚紅疹

