

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:113089-1

日期:113年11月13日

認識退燒藥！

一、Acetaminophen（乙醯胺酚）：俗稱普拿疼的成分，不含阿斯匹靈、不傷胃、不影響腎功能，通常吃完藥後1小時內會退燒，若服用乙醯胺酚過量，或肝功能下降時，肝臟就無法正常代謝，其代謝物反而會產生毒性，發生肝傷害，因此民眾仍應按醫師或藥師指示服用。

二、NSAIDs（非類固醇類解熱鎮痛藥）：此類藥品種類繁多，且退燒效果好，主要分為兩大類，一為含有Cox-1抑制劑，可能會引起腸胃道不舒服的副作用，腎功能不佳者，也要避免自行服用。二為僅含有Cox-2抑制劑，比較不會傷胃，但長期服用恐有影響腎功能的疑慮。

三、類固醇：通常於自體免疫疾病發燒時使用。適度的發燒可以提升免疫系統的效能，在未確定病因前，不要冒然退燒！若正在服用抗血小板、抗凝血劑、高血壓等藥品，或自體免疫疾病患者有服用類固醇等藥品，應先諮詢醫師或藥師，以免產生藥品交互作用，危害健康。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:113089-2
日期:113年11月27日

領取第一級至第三級管制藥品 SOP

民眾領取**第一級至第三級**管制藥品，
使用**專用處方箋 SOP**

憑處方箋領藥

攜帶醫師/牙醫師開立的
管制藥品專用處方箋

身分證明/簽名

出示身分證明文件，領受人
於管制藥品專用處方箋上簽名

調劑一次為限

第一級、第二級管制藥品
專用處方箋，以調劑一次為限

管制藥品

若有任何用藥疑問，請務必向藥師詢問！