

核判 區分	主任	副主任				
		√				

編號:114093

日期:114年10月27日



雙週藥訊

藥的型態百百種

● 發泡錠：發泡錠和一般的固體藥品不同，使用前一定先加水產生化學反應，釋出氣泡（二氧化碳）才後服用！會這樣設計的藥品，通常是為了增加接受度，以避免腸胃刺激、或製造出太大顆錠劑難以吞服。

● 口服懸浮液：懸浮液為液體中含有固體的型態，常需要自行將藥粉加指定量的水，配製成懸浮液後，才能使用！每次使用前請先搖勻，並依指定劑量使用！

※用藥注意事項：由於每種藥品的使用方法、劑量都不相同，使用前要看清楚藥袋、外盒、說明書標示，才能正確、安心地服用，若不清楚如何使用，要諮詢醫師、藥師後再使用喔！

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](http://www.rvice.fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				

編號:114093

日期:114年10月27日



雙週藥訊

藥的型態百百種

● 發泡錠：發泡錠和一般的固體藥品不同，使用前一定先加水產生化學反應，釋出氣泡（二氧化碳）才後服用！會這樣設計的藥品，通常是為了增加接受度，以避免腸胃刺激、或製造出太大顆錠劑難以吞服。

● 口服懸浮液：懸浮液為液體中含有固體的型態，常需要自行將藥粉加指定量的水，配製成懸浮液後，才能使用！每次使用前請先搖勻，並依指定劑量使用！

※用藥注意事項：由於每種藥品的使用方法、劑量都不相同，使用前要看清楚藥袋、外盒、說明書標示，才能正確、安心地服用，若不清楚如何使用，要諮詢醫師、藥師後再使用喔！

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](http://www.rvice.fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您