

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號: 114097

日期: 114年11月11日

## 手術前藥品續用或停用原則

多數用於控制慢性疾病的藥物，在手術期間是可以繼續使用的。尤其是需要監測血中濃度的藥物，例如 digoxin、phenytoin、valproic acid 等，都是建議在手術期間持續使用並監測的藥物。若是藥物突然停用會造成脫癮、反彈症候群，例如 clonidine、降血壓藥中的  $\beta$  型阻斷劑等，也應在手術期間不中斷使用，以維持治療穩定性。

藥物是否要停用或持續使用，往往與手術種類、患者年齡、肝腎功能、藥物交互作用等因素有關。

醫師會依病人整體狀況進行判斷，避免因停藥或續用藥物而增加手術風險，因此術前向醫師諮詢自身用藥，由醫師自己把關，聽從醫師的建議才是最好的方法。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號: 114097

日期: 114年11月25日

## 正確服藥這樣做

### 1. 遵照醫囑、藥袋標示正確用藥

服用藥品前，應了解藥袋上的重要資訊，並遵照醫師或藥師指示使用，仔細閱讀標籤、外盒或說明書，注意有關警告事項，以免藥品副作用發生。

### 2. 以正確方式服用藥品

**避免與特定飲品同服：**避免搭配茶類、果汁或牛奶，因其中的咖啡因、酸性成分或鈣、鎂等元素，可能影響藥品吸收或引起交互作用，影響療效。**服藥搭配足量水：**每次服藥應飲用至少 200 至 250 毫升水，以減少藥品卡在食道，服藥後應避免立即俯臥或躺下，如需睡前服藥，建議至少提前 30 分鐘服用。

### 3. 注意服藥小細節，避免錯誤服藥

- 避免黑暗下拿錯或吃錯藥品。
- 藥品應置於原藥袋及包裝，標籤勿撕除。
- 不同藥品勿放置在同一容器。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您