

核判 區分	主任	副主任				
		√				

編號:1150015

日期:115年03月6日




# 雙週藥訊

## 症狀改善還要繼續吃藥嗎？

### 處方用藥不能隨意停！



抗生素需要依照療程服用完整天數，隨意停藥會讓殘存的細菌產生抗藥性，增加治療難度。



慢性病藥品擅自停藥或減藥，可能影響病情控制，嚴重還將導致併發症。

 衛生福利部  
食品藥物管理署  
Taiwan Food and Drug Administration

廣告

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:1150015-2

日期:115年03月13日

## 防止青光眼惡化，正確用藥守住視力

青光眼是常見的眼睛疾病，其危險性在於會造成視神經損傷，且一旦受損便無法恢復。若沒有及時治療，可能導致視野缺損，甚至永久失明。

### 治療方式：眼藥水是第一線

造成青光眼主要成因是「眼壓過高」。眼球內擁有「房水」液體，負責維持眼內壓力並提供養分，再經由特定通道排出體外。

### 正確點藥、建立良好生活習慣

青光眼治療的關鍵在於「持續控制」。只要遵照醫囑規律用藥，加上良好生活習慣，就能大幅降低視力受損的風險，為眼睛健康把關。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您