

核判 區分	主任	副主任				
		✓				

編號:115050-1

日期:115 年 07 月 09 日



雙週藥訊

用藥安全6重點

遠離嚴重肝損傷



① 告知病史和用藥情況



② 遵循醫囑使用藥品



③ 注意藥品不良反應



④ 避免酒精和其他有害物質



⑤ 保持良好的健康習慣



⑥ 定期就醫檢查

肝臟疾病
高風險族群

- ▶ 高齡者 ▶ 慢性B、C型肝炎帶原者 ▶ 肝功能不佳者
- ▶ 非酒精性脂肪肝病患 ▶ 慢性酗酒者 ▶ 服用多種藥物者



衛生福利部食品藥物管理署
Taiwan Food and Drug Administration



財團法人藥害救濟基金會
Taiwan Drug Relief Foundation

廣告

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:115050-2

日期:115 年 07 月 23 日

藥丸吞下後真的會釋放藥效嗎？

服用藥品時，您是否曾想過：這顆藥丸吞入體內後，是如何釋放有效成分，進而被人體吸收並發揮治療效果？為確保藥品在體內能適當釋放，有一項重要的品質檢驗指標，即為「溶離試驗」(Dissolution)。

什麼是「溶離試驗」？

所謂「溶離」，是指藥品中的有效成分溶解於液體中的過程。當藥品進入人體後，需先在胃液或腸液中溶解，才能被吸收利用。溶離試驗即透過儀器模擬人體消化道的環境（如溫度維持在 37°C 及不同的酸鹼值條件），檢測藥品在特定時間內釋放出有效成分的比例與速率。

民眾服藥時應注意以下幾點：

1. 避免任意磨粉或剝半：任意改變劑型，可能導致藥品快速釋放，增加不良反應危險。
2. 以開水送服為宜：茶、果汁或牛奶可能影響胃部環境，進而影響藥品的溶離與吸收。
3. 注意保存環境條件：潮濕與高溫環境可能導致藥品變質，影響其溶離特性，應依藥品說明書（仿單）或外包裝指示妥善保存。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您